

寨卡疫情在拉丁美洲和加勒比海国家大肆流行

感染寨卡病毒 可致新生儿小头畸形

怀孕、备孕的女性,千万别去巴西等 22 个国家和地区

自去年 5 月以来,寨卡疫情在拉丁美洲和加勒比海国家大肆流行,已有 18 个国家报告了感染病例。疫情最严重的巴西,感染者多达 150 万人,新生儿小头症疑似病例激增至 3894 例。寨卡病毒被怀疑是新生儿小头症的罪魁祸首,拉美多国公开呼吁妇女推迟怀孕,萨尔瓦多竟然建议本国妇女今明两年都不要生孩子。美国疾控中心 22 日建议,孕妇及备孕的女性最好避免前往发生寨卡疫情的 22 个国家和地区。你的旅行目的地是否在黑名单上?今年 8 月在巴西里约热内卢举办的奥运会,你是去呢,还是不去呢?



巴西全国展开灭蚊运动以防止寨卡病毒传播

巴西疫情最严重 >>> 疑似小头症病例近 4000

巴西目前是寨卡疫情最为严重的国家。自 2015 年 5 月确诊第一例寨卡病毒感染病例后,疫情迅速蔓延,短短 8 个月内有 150 万人感染。

感染寨卡病毒后,多数患者没有任何症状,20% 的患者出现轻微症状——包括低烧、皮疹、关节疼痛、结膜炎等。这种病不传染,很少致命,一周内症状即可消失,预后良好,以色列一名两岁幼儿从哥伦比亚回国后被确诊感染寨卡,经治疗也已迅速康复。

然而,寨卡病毒最可怕之处在于,它可能是新生儿罹患小头症的罪魁祸首。该病毒会干扰胎儿神经系统发育,导致胎儿流产、新生儿小头畸形甚至死亡。

巴西卫生部近日表示,去年 10 月至今年 1 月 16 日,该国出现新生儿小头症疑似病例 3893 例,其中 49 例死亡,而 2014 年全年小头症病例只有 147 例。世界卫生组织发言人林德梅尔解释说,“寨卡病毒与小头症之间的关系仍在研究当中”,畸形可能与多个因素有关,但寨卡病毒“似乎是主要可疑因素”。

患小头症的婴儿,容易大脑发育不良,出现身体残疾和智力障碍,比如视听障碍、行动障碍和认知障碍。

寨卡病毒是怎么传到巴西的? 2013 年至 2014 年,法属波利尼西亚寨卡病毒疫情暴发,当地大约有 11% 的居民被感染。专家推测,2014 年世界杯期间,法属波利尼西亚的游客将寨卡病毒传到了巴西。

为控制疫情,巴西卫生部在全国范围内展开灭蚊防疫运动,包括大规模喷雾消毒,甚至派军队去疫区摧毁蚊子的栖息地。巴西卫生专家警告说,下个月的狂欢节庆祝活动可能加剧病毒的传播。

今年 8 月,里约热内卢将举办奥运会,预计将迎来全球的 1.05 万名运动员以及数十万的观赛观众。参赛观赛是否安全,现在都是个未知数。

拉美多国建议推迟怀孕 >>> 萨尔瓦多号召两年别生娃

寨卡病毒在拉美的肆虐导致一个前所未有的现象,

多国政府公开呼吁妇女推迟怀孕以规避新生儿小头症的风险。

哥伦比亚疫情严重程度仅次于巴西。该国卫生和社会保障部长亚力杭德罗·加维里亚近日表示,该国有超过 1.35 万人感染寨卡病毒,出现约百名小头症婴儿,预计 2016 年感染寨卡患者可能多达 60 万人。他建议该国妇女推迟 8 个月再怀孕:“我们这样做,是因为我相信这是避免风险的好办法,提醒大家可能会有严重的后果。”

厄瓜多尔、牙买加、洪都拉斯也发布了类似的官方警告,要求本国妇女推迟怀孕。

但没有一个国家比萨尔瓦多走得更极端。从去年 11 月发现首例疑似寨卡病毒感染病例至今,短短两个多月时间,萨尔瓦多共出现 5561 例疑似病例。萨尔瓦多卫生部副部长爱德华多·埃斯皮诺萨 21 日呼吁该国妇女在 2018 年前避免怀孕。他说:“建议你们规划好怀孕时间,今年明年尽可能别生孩子。”当然,这只是一个建议,并非官方政策。

欧美出现输入病例 >>> 警告孕妇勿去疫区

1 月 16 日,此次寨卡病毒在拉美流行以来,美国本土首次确诊寨卡感染病例。一名曾在巴西居住的孕妇回到夏威夷后,诞下小头症新生儿,宝宝被确诊感染寨卡病毒。

1 月 22 日,纽约州宣布确诊 3 名寨卡病毒携带者,他们曾前往疫区旅行,其中一人已痊愈,两人正在好转,没有出现并发症。

截至 1 月 18 日,英国已报告 3 例寨卡感染案例,患者曾前往哥伦比亚、苏里南和圭亚那。

英国公共卫生部门发表声明说:“英国本土并无寨卡病毒的自然传播,这种病毒通过蚊子叮咬传播,在极罕见的情况下,可以通过性行为传播或由孕妇通过胎盘传染给胎儿。”“它不会直接从人传染给人。”声明还说。

目前还没有治疗、预防寨卡病毒的有效药物或疫苗。1 月 22 日,美国疾病控制和预防中心发布旅行警告,建议美国公民应慎重前往寨卡病毒正在流行的 22 个国家和地区。必须前往上述地区的孕妇行前应咨询医生或其他医疗专家的意见,并在旅途中严格执行避免蚊子叮咬的措施。

染寨卡病毒目前尚无治疗方法。建议患者多休息、多喝水,必要的话可吃止痛药,症状一般持续数日即消失。

感染寨卡病毒的几率有多高?

感染几率相对来说还是很小的。对大多数人来说,感染寨卡病毒不会有严重的后果。但问题是,此病目前无药可医,也没有疫苗,对胎儿健康构成巨大的威胁,哥伦比亚和萨尔瓦多当局建议孕妇目前不要怀孕。

孕妇不宜去哪些国家和地区?

针对寨卡病毒肆虐,美国疾病控制和预防中心发布的旅行警告名单上有 22 个国家和地区:巴西、哥伦比亚、萨尔瓦多、法属圭亚那、危地马拉、海地、洪都拉斯、马提尼克岛、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、苏里南、委内瑞拉、波多黎各、巴巴多斯、玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、法属瓜德罗普岛、佛得角、萨摩亚和圣马丁岛。(综合《南方都市报》、《新快报》)

国际时讯 >>>

老挝中部发生炸弹袭击 致 3 名中国人 2 死 1 伤

中国外交部发言人华春莹 25 日在回答记者提问时称,1 月 24 日上午,不明身份的暴力分子在老挝赛宋奔省发动暴力袭击,造成中国公民 2 人死亡,1 人受伤。我使馆对此高度重视,立即启动应急机制,会同老方全力救治伤员,妥善处理死者善后。同时要求老方尽快破案,并采取有效措施,确保中国公民在老挝人身安全。目前老方正就此事进行调查。

中国大使馆再次提醒在老中国公民加强安全防范,如遇突发事件,请即与中国驻老挝使领馆电话联系:

中国驻老挝大使馆:00856-20-55561680;

中国驻琅勃拉邦总领馆:00856-20-55571303。

(据外交部网站)

中缅国际铁路 怒江特大桥全面开工

据新华社电 中缅国际铁路大理至瑞丽段的控制性工程——怒江特大桥 24 日全面开工,它也是目前世界上跨度最大的钢桁梁铁路拱桥。

位于云南省施甸县与龙陵县交界处的怒江特大桥全长 1024.2 米,江面到桥面的高度为 211 米。施工方中铁十八局集团大瑞铁路指挥长阎树新告诉记者,由于受高黎贡山和怒江特殊地形的限制,怒江车站就设在桥面上,四线桥面的宽度达 24.9 米,属国内同类型铁路桥梁之最。同时,怒江特大桥的用钢量达 46000 多吨,在国内同类桥梁中是少有的,钢桁梁的制造加工精度、高空拼装的难度和风险也是国内罕见的。

昆明至缅甸仰光的中缅国际铁路全长 1920 公里,我国境内路段长 690 公里,昆明至大理的 350 公里路段已建成,大理至瑞丽的 340 公里路段施工进入攻坚阶段。

土耳其媒体称 美特种兵进入叙利亚作战 在叙获得首个基地

据土耳其媒体 24 日消息,五角大楼方面将 100 名特种部队队员及武装直升机部署在叙利亚的空军基地,该空军基地建立在库尔德民兵所控制的区域,座落在叙利亚东北部与土耳其和伊拉克临近的边境处。

他们将用于反对叙利亚的“伊斯兰国”组织的三架火力增援战斗机配置在此首个基地,这些飞机也能够进行搜救活动。据悉,在这一空军基地将展开建造一个指挥中心,向当地运送武器以及弹药,将对“伊斯兰国”极端组织展开地面进攻。(据央视)

<< 焦点问答 >>

什么是寨卡病毒(Zika virus)?

“Zika”是乌干达语,意思是杂草。1947 年,科学家在乌干达研究黄热病,从猴子体内分离到寨卡病毒。寨卡病毒属于黄病毒家族,与乙型肝炎病毒、登革热病毒、西尼罗病毒是近亲。1954 年,尼日利亚首先证实了 3 例人类寨卡病毒感染病例。2013 年-2014 年,法属波利尼西亚寨卡病毒疫情暴发。此后,寨卡病毒开始在非洲和亚洲以外的多国流行。

寨卡病毒是如何传播的?

寨卡病毒通过蚊虫叮咬在人和动物间传播,属于人畜共患疾病。传播寨卡病毒的伊蚊也传播登革热、基孔肯雅热。寨卡病毒可在人类血液存活,蚊子叮咬感染病毒的人,可将此病毒进一步传播。如果孕妇感染,极可能会导致新生儿小头症甚至胎儿死亡。世界卫生组织表示,感